

## 「伊勢湾の溶存酸素濃度状況（参考）」



令和6年7月

伊勢湾再生推進会議

国土交通省 第四管区海上保安本部及び愛知県水産試験場において調査された結果を用いて、海域の海底付近の DO（溶存酸素濃度）の分布図及び水深方向の水質（水温・塩分・DO）の分布図を整理しました。

■観測日時（令和5年7月と8月の愛知県水産試験場による貧酸素水塊の調査日）

令和5年7月3～5日、18日、24日、令和5年8月2～3日、17日、21日、23～24日

■観測データ

・国土交通省 第四管区海上保安本部：ほぼ毎月、伊勢湾の定点観測を行っています。

（第四管区海上保安本部 HP（伊勢湾の水温・塩分・流況・溶存酸素量情報）

[https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN4/kaisyo/isewan/isewan\\_kankyo.html](https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN4/kaisyo/isewan/isewan_kankyo.html)

・愛知県水産試験場：6月から10月にかけて貧酸素水塊のモニタリングを行っており、底層DOの分布図を公表していますので、興味をもたれた方はぜひご覧ください。

（愛知県水産試験場 HP（伊勢・三河湾貧酸素情報） <http://www.pref.aichi.jp/suisanshiken/>

### DO(溶存酸素濃度)とは、

水中に溶解している酸素量を示し、量が多いほど値が大きくなります。溶存酸素は、水中の生物の呼吸などに使われるので、欠乏すると魚介類のへい死や水の腐敗が起こります。

閉鎖性の強い海域の海底では、富栄養化によって異常繁殖したプランクトンが死滅し沈降して、それを細菌が活発に分解するため、溶存酸素濃度が極度に低下します。


その状態が進行し、魚介類が生存できないくらいに溶存酸素濃度が低下した水の塊のことを、「**貧酸素水塊**」といいます。貧酸素水塊は、苦潮が発生する要因といわれています。

表-1 DO(溶存酸素濃度)が魚介類へ与える影響

DO(溶存酸素濃度)	魚介類への影響
約 4mg/l	魚類・甲殻類に悪影響
約 2mg/l	貝類・底生魚類の生存困難
約 0.8mg/l	全ての底生生物の生存困難


伊勢湾・三河湾では貧酸素水塊が毎年確認されており、その影響を受けて苦潮も毎年発生しています。令和4年は3件の苦潮が三河湾で発生し、このうち、水産生物に被害を及ぼしたものは1件であった。発生件数は平年（過去10年平均）の4.1件と比較し、少なかった。

※令和5年11月時点での情報のため令和5年度の赤潮の発生状況は公表されていない。




出典：愛知水試研究業績 C-247「令和4年 伊勢湾・三河湾の赤潮発生状況」 URL : <http://www.pref.aichi.jp/0000007549.html>

伊勢湾の海底付近の DO 分布(溶存酸素飽和度の分布) 令和 5 年 7 月 3~5 日、18 日、24 日



観測期間：令和 5 年 7 月 3~5 日

観測期間：令和 5 年 7 月 18 日




観測期間：令和 5 年 7 月 24 日

愛知県水産試験場では、溶存酸素飽和度 50%以下を低酸素、30%以下を貧酸素としている。溶存酸素飽和度(%)と溶存酸素濃度(ppm)、魚介類への影響の関係は、おおよそ以下のとおりです。

酸素飽和度	溶存酸素濃度	魚介類への影響
50%	約 4.0ppm	魚類・甲殻類に悪影響
30%	約 2.4ppm	貝類・底生魚類の生存困難
10%	約 0.8ppm	全ての底生生物の生存困難


図表の出典：愛知県水産試験場 HP(伊勢・三河湾貧酸素情報)  
 注)海底付近の DO 分布の中で赤色の部分は、貧酸素水塊となります。

**伊勢湾の海底付近の DO 分布 (溶存酸素飽和度の分布) 令和 5 年 8 月 2~3 日、17 日、21 日、23~24 日**



観測期間：令和 5 年 8 月 2~3 日

観測期間：令和 5 年 8 月 17 日



観測期間：令和 5 年 8 月 21 日

観測期間：令和 5 年 8 月 23~24 日

愛知県水産試験場では、溶存酸素飽和度 50%以下を低酸素、30%以下を貧酸素としている。溶存酸素飽和度(%)と溶存酸素濃度(ppm)、魚介類への影響の関係は、おおよそ以下のとおりです。


酸素飽和度	溶存酸素濃度	魚介類への影響
50%	約 4.0ppm	魚類・甲殻類に悪影響
30%	約 2.4ppm	貝類・底生魚類の生存困難
10%	約 0.8ppm	全ての底生生物の生存困難

図表の出典：愛知県水産試験場 HP(伊勢・三河湾貧酸素情報)  
注)海底付近の DO 分布の中で赤色の部分は、貧酸素水塊となります。

**令和5年7月の結果(観測期間:7月3~5日、24日)と8月の結果(観測期間:8月2~3日、23~24日)との比較**

観測時期の違いによる、海底近くの貧酸素水塊の分布を以下に示します。

海底付近のD0分布の中で赤色の部分が、貧酸素水塊となります。




図の出典:愛知県水産試験場 HP(伊勢・三河湾貧酸素情報)

- 伊勢湾では、7月中旬には三重県側から湾奥にかけて貧酸素水塊が発生しています。8月上旬には、湾中央から湾口に貧酸素水塊が発生しています。
- 三河湾では、7月中旬に東部湾奥に貧酸素水塊が発生し、8月上旬には湾全体でやや酸素量が減少しています。


### 水深方向の分布(水温・塩分・DO)

第四管区海上保安本部が実施している伊勢湾の定点観測結果 (Line-A, B, C) の令和5年7月、8月の結果を整理しました。令和5年7月には (LineA, B)、8月には (LineA, B, C) で調査を行っています。次のページから、水深が変化するにつれて、「水温・塩分・DO」がどのように変化しているかを示します。




調査位置の出典: 第四管区海上保安本部 HP(伊勢湾の水温・塩分・流況・溶存酸素量情報)

■観測期間:令和5年7月25日






■観測期間:令和5年8月25日、26日



調査日の流況図の出典:第四管区海上保安本部 HP(伊勢湾の水温・塩分・流況・溶存酸素量情報)


Line-A 令和5年7月25日



図の出典: 第四管区海上保安本部 HP(伊勢湾の水温・塩分・流況・溶存酸素量情報)

- 水温は海面付近が 27℃程度、A1 を除く海底付近が 20℃以下で、海面付近と底層の水温の差は 7℃程度です。
- 塩分は海面付近が 26psu 程度、海底付近が 33psu 程度で、海面付近と底層の塩分の差は 7psu 程度です。(psu : 実用塩分単位)
- 水深が比較的深いところの底層は DO の値が 2.5 以下となっており、貧酸素水塊が形成されていることがわかります。
- 貧酸素水塊が形成されている場所は水温が 18℃と低く、塩分が 33psu 程度と高い傾向があります。


Line-B 令和5年7月25日



図の出典: 第四管区海上保安本部 HP(伊勢湾の水温・塩分・流況・溶存酸素量情報)

- 水温は海面付近が 27°C程度、海底付近が 20°C以下で、海面付近と底層の水温の差は 9°C程度です。
- 塩分は海面付近が 27psu 程度、海底付近が 33psu 程度で、海面付近と底層の塩分の差は 6psu 程度です。(psu : 実用塩分単位)
- B1、B2 を除く底層は DO の値が 2.5 以下となっており、貧酸素水塊が形成されていることがわかります。
- 貧酸素水塊が形成されている場所は水温が 19°Cより低く、塩分が 33psu 程度と高い傾向があります。


Line-A 令和5年8月29日



図の出典: 第四管区海上保安本部 HP(伊勢湾の水温・塩分・流況・溶存酸素量情報)

- 水温は海面付近が 29℃程度、海底付近が 26℃程度で、海面付近と底層の水温の差は 3℃程度です。
- 塩分は海面付近が 20psu 程度、海底付近が 32psu 程度で、海面付近と底層の塩分の差は 10psu 程度です。(psu : 実用塩分単位)
- A1、A2 を除いて底層は DO の値が 2.5 以下となっており、貧酸素水塊が形成されていることがわかります。
- 貧酸素水塊が形成されている場所は水温が 26℃より低く、塩分が 32psu 程度と高い傾向があります。




Line-B 令和5年8月29日



図の出典: 第四管区海上保安本部 HP(伊勢湾の水温・塩分・流況・溶存酸素量情報)

- 水温は海面付近が 29℃程度、海底付近が 22℃程度で、海面付近と底層の水温の差は 7℃程度です。
- 塩分は海面付近が 24psu 程度、海底付近が 32psu 程度で、海面付近と底層の塩分の差は 8psu 程度です。(psu : 実用塩分単位)
- 底層は DO の値が 2.5 以下となっており、貧酸素水塊が形成されていることがわかります。
- 貧酸素水塊が形成されている場所は水温が 22℃程度と低く、塩分が 32psu 程度と高い傾向があります。

Line-C 令和5年 8月 28日



図の出典: 第四管区海上保安本部 HP(伊勢湾の水温・塩分・流況・溶存酸素量情報)

- 水温は海面付近が 29℃程度、海底付近が 23℃程度で、海面付近と底層の水温の差は 6℃程度です。
- 塩分は海面付近が 10psu から 27psu 程度、海底付近が 33psu 程度です。(psu : 実用塩分単位)
- C2 から C7 の底層は DO の値が 2.5 以下となっており、貧酸素水塊が形成されていることがわかります。
- 貧酸素水塊が形成されている場所は水温が 23℃程度と低く、塩分が 32psu 程度と高い傾向があります。

溶存酸素が欠乏する理由:

底層の溶存酸素が欠乏する理由は、次の2つが考えられます。

理由 1:

海底中に有機物がたくさんあり、バクテリアが溶存酸素をたくさん消費するため

富栄養化によって異常繁殖したプランクトンが死滅し海底に沈降すると、それをバクテリア(微生物)が活発に分解します。バクテリアは分解する際に溶存酸素を消費するため、溶存酸素濃度が極度に低下します。

理由 2:

夏季は底層の海水が表層等の水塊と混ざりにくく、溶存酸素が供給されにくくなっているため

- ① 夏季は、底層の水が表層の海水よりも水温が低いので、密度が高くなり、他の水温の水と混ざりにくくなっている。

例として、7月のLine-AのA1を除く表層の水温は27°C程度、底層の水温は20°C以下で、7°C以上の差があります。

同様に7月のLine-Bの表層の水温は27°C程度、底層の水温は20°C程度で、7°C程度の差があります。

- ② 夏季は、底層の水が表層の海水よりも塩分が高いため、密度が高くなり、他の塩分の水と混ざりにくくなっている。

例として、7月のLine-Aの表層の塩分は26psu程度、底層の塩分は33psu程度で、7psu程度の差があります。

同様に7月のLine-Bの表層の塩分は27psu程度、底層の塩分は33psu程度で、6psu程度の差があります。

以上のように、夏季は、底層の海水の水温が、表層や中層の海水と比べ低く、また、底層の海水の塩分が、表層や中層の海水と比べ高いため、底層の海水は、ほかの水塊と混ざりにくく、酸素が供給されにくい状況にあると言えます。

夏季は海面に比べて海底の方が水温は低くなり、塩分は高くなる傾向があります。海面と海底の間で海水の密度差が生じ、酸素を含んだ海水が海底の海水に混ざりにくくなります。